

บัญชีรายการยาโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2567

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat.	เงื่อนไข
<b>กลุ่มยา 1 : GASTRO-INTESTINAL SYSTEM</b>					
<b>1.1 ANTACIDS AND DRUGS FOR DYSPEPSIA</b>					
1	ALUMINA AND MAGNESIA GEL 240 ML	SUSP.	ก		
2	CARMINATIVE MIXTURE 180 ML	MIXT.	ก		
3	SIMETHICONE 40 MG/0.6 ML DROP 15 ML	SUSP.	ก	C	
4	SIMETHICONE 80 MG	TAB.	ก	C	
<b>1.2 ANTISPASMODIC AND DRUGS ALTERING GUT MOTILITY</b>					
5	DOMPERIDONE 10 MG.	TAB.	ก	C	
6	DOMPERIDONE SUSP 10 MG/5 ML 30 ml	SUSP.	ก	C	
7	HYOSCINE 10 MG.	TAB.	ก	C	
8	HYOSCINE 5 MG./5 ML 30 ML	SYR.	ก	C	
9	HYOSCINE 20 MG./ML.	INJ.	ก	C	
10	METOCLOPRAMIDE 10 MG./2 ML.	INJ.	ก	B	
<b>1.3 ULCER-HEALING AND DRUGS USED IN VARICEAL BLEEDING</b>					
11	OMEPRAZOLE 20 MG.	CAP.	ก	C	
12	OMEPRAZOLE 40 MG.	INJ.	ข	C	
13	RANITIDINE 150 MG.	TAB.	ก	B	
14	RANITIDINE 50 MG./2 ML.	INJ.	ข	B	
15	MISOPROSTAL 200 MG	TAB.		X	
<b>1.4 DRUG USED IN ACUTE DIARRHOEA</b>					
16	ORS adult	PWDR.	ก		
17	ORS children	PWDR.	ก		
<b>1.6 LAXATIVES</b>					
18	MILK OF MAGNESIA 240 ML.	SUSP.	ก		
19	UNISON 20 ML.	ENEMA	ก		
20	UNISON 133 ML.	ENEMA	ก		

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
	1.7 LOCAL PREPARATIONS FOR ANAL AND RECTAL DISORDERS				
21	PROCTOSEDYL SUPPOSITORY	SUPP.	๗		
<b>กลุ่มยา 2 : CARDIOVASCULAR SYSTEM</b>					
	2.1 POSITIVE INOTROPIC DRUGS				
22	DIGOXIN 0.25 MG.	TAB.	ก	C	
23	Digoxin	INJ.	ก		
	2.2 DIURETICS				
24	FUROSEMIDE 40 MG.	TAB.	ก	C;D*	
25	FUROSEMIDE 20 MG./2 ML.	INJ.	ก	C;D*	
26	FUROSEMIDE 250 MG./25 ML.	INJ.	ก	C;D*	
27	HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG.	TAB.	ก	B;D**	
28	SPIRONOLACTONE 25 MG.	TAB.	ก	C;D*	
	2.3 ANTI-ARRHYTHMIC DRUGS				
29	ADRENOSINE	INJ.	ค	C	ใช้สำหรับ supraventricular arrhythmias และการตรวจ พิเศษทางหัวใจ
30	AMIODARONE	INJ.	ค	D	ใช้สำหรับ supraventricular , ventricular และ atrial arrhythmias
	2.4 BETA-ADRENOCEPTOR BLOCKING DRUGS				
31	METOPROLOL	TAB.	ก		
32	PROPRANOLOL 10 MG.	TAB.	ก	C;D**	
33	PROPRANOLOL 40 MG.	TAB.	ก	C;D**	
	2.5 DRUGS AFFECTING THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM AND ANTIHYPERTENSIVE DRUGS				
34	HYDRALAZINE INJ. 20 MG.	INJ.	ก	C	ชนิดฉีด ใช้สำหรับ hypertensive emergencies ในหญิง ตั้งครรภ์
35	ENALAPRIL 5 MG.	TAB.	ก	C;D**	
36	ENALAPRIL 20 MG.	TAB.	ก	C;D**	

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
37	CAPTOPRIL (stat ER for HT)	TAB.	ก		ใช้สำหรับ hypertensive urgency (กรณีที่สถานพยาบาลไม่มียาฉีดหรือไม่สามารถใช้ยาฉีดในการรักษา hypertensive emergencies อาจพิจารณาใช้ captopril เป็นทางเลือกในการรักษา
38	HYDRALAZINE 25 MG.	TAB.	ก	C	
39	LOSARTAN 50 MG	TAB.	ข	C;D**	ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่ม Angiotensin-converting enzyme inhibitors ไม่ได้เนื่องจากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว
	2.6 <u>NITRATES, CALCIUM-CHANNEL BLOCKERS AND VASODILATORS</u>				
40	AMLODIPINE 5 MG.	TAB.	ก	C	
41	ISOSORBIDE DINITRATE 10 MG.	TAB.	ก	C	
42	ISOSORBIDE DINITRATE SUBLING. 5 MG.	TAB.	ก	C	
	2.7 <u>Centrally acting antihypertensive drugs</u>				
43	METHYLDOPA 250 MG (ยา refer back)	TAB.	ก		ใช้สำหรับรักษาความดันเลือดสูงในหญิงตั้งครรภ์
	2.8 <u>Alpha-adrenoceptor blocking drugs</u>				
44	Doxazosin (ยา refer back ต่อมลูกหมาก)	TAB.	ค		
	2.7 <u>SYMPATHOMIMETICS</u>				
45	ADRENALINE 1 MG./ML.	INJ.	ก	C	
46	DOPAMINE HCl 250 MG./10 ML.	INJ.	ก	C	
	2.8 <u>ANITCOAGULANTS</u>				
47	HEPARIN	INJ.	ค	C	
	2.9 <u>ANTIPLATELET DRUGS</u>				
48	ASPIRIN 81 MG.	TAB.	ก	C;D*	

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
49	CLOPIDOGREL 75 MG	TAB.	ง	B	<p>1. ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ aspirin ไม่ได้ เฉพาะกรณีที่ใช้ป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมองแบบทุติยภูมิ (secondary prevention)</p> <p>2. ให้ร่วมกับ aspirin หลังการใส่ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (stent) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี</p> <p>3. ใช้ในกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับ aspirin แล้วยังเกิด acute coronary syndrome หรือ recurrent thrombotic events</p> <p>4. ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็น non-ST elevated acute coronary syndrome ให้ใช้ clopidogrel ร่วมกับ aspirin เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี</p> <p><b>หมายเหตุ</b> ระมัดระวังการใช้ยา clopidogrel ร่วมกับ aspirin เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการเลือดออกได้มากกว่าการใช้ aspirin หรือ clopidogrel เพียงชนิดเดียว</p>
50	ASPIRIN 300 MG.	TAB.	ก	C;D*	
	2.12 <u>LIPID-REGULATING DRUGS</u>				
51	GEMFIBROZIL 300 MG	CAP	ก	C	

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
52	SIMVASTATIN 20 MG.				<b>คำเตือนและข้อควรระวัง</b> 1. กรณีผู้ป่วยรายใหม่ไม่ควรให้ยา simvastatin เกินวันละ 40 mg สำหรับผู้ป่วยที่เคยใช้มานานเกิน 1 ปี โดยไม่เกิดผลข้างเคียงให้ใช้ยาในขนาดเดิมต่อไปได้ 2. ห้ามใช้ยา simvastatin ร่วมกับ gemfibrozil, cyclosporine, danazol หรือยาในกลุ่ม strong CYP3A4 inhibitors เช่น itraconazole, ketoconazole เป็นต้น 3. หลีกเลี่ยงการใช้ยา simvastatin 3.1 ในขนาดเกินวันละ 20 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา amlodipine หรือ amiodarone 3.2 ในขนาดเกินวันละ 10 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา diltiazem หรือ verapamil
53	SIMVASTATIN 10 MG. (ยาโครงการพิเศษ ARV)				เช่นเดียวกับ simvastatin 20 mg
54	ATORVASTATIN 40 MG (ยาโครงการพิเศษ ARV)	TAB.	ง		เช่นเดียวกับ simvastatin 20 mg
	2.13 Other				
55	ALFUZOCIN (ยา refer back ต่อมลูกหมาก)	TAB.	ค		ใช้ กับผล refer back
56	FINASTERIDE (ยา refer back ต่อมลูกหมาก)	TAB.	ง		ใช้กับผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตที่มีอาการผิดปกติในการบัสสภาวะระดับปานกลางถึงรุนแรง และมีขนาดของต่อมลูกหมากมากกว่า 40 ml
57	NITROGLYGLYCERINE (service plan)	INJ.			
58	NOREPHINEPHRINE (levophed) (service plan)	INJ.	ก		
59	STREPTOKINASE (service plan)		ก		
<b>กลุ่มยา 3 : RESPIRATORY SYSTEM</b>					
	3.1 BRONCHODILATORS				
60	SALBUTAMOL 2 MG.	TAB.	ก	C	
61	SALBUTAMOL 2 MG./5 ML. 60 ML	SYR.	ก	C	
62	SALBUTAMOL 100 MCG 200 DOSE	MDI	ก	C	

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
63	SALBUTAMOL 5 MG./ML. 20 ML	SOL	ก	C	
64	TERBUTALINE 0.5 MG./ML.	INJ.	ก	B	
65	IPRATROPIUM + FENOTEROL 20 ML (berodual)	SOL	ก	B	
66	IPRATROPIUM + FENOTEROL MDI (berodual)	MDI	ก	B	
67	THEOPHYLLINE 200 MG.	TAB.	ก	C	
	3.2 <u>CORTICOSTEROIDS</u>				
68	BUDESONIDE 200 MCG. 200 DOSE	MDI	ก	B	
69	SALMETEROL+FLUTICASONE (evoflo)	MDI	ค	C	<p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>1. ใช้สำหรับควบคุมอาการเท่านั้น</p> <p>2. การใช้ long acting beta2-agonist(LABA) เช่น fluticasone และ salmeterol เป็นยาเดี่ยว เพิ่มความเสี่ยงของโรคหืดกำเริบรุนแรงและการเสียชีวิตการโรคหืด</p>
70	Salmeterol +Fluticasone accuhaler	Accu	ค		<p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>1. ใช้สำหรับควบคุมอาการเท่านั้น</p> <p>2. การใช้ long acting beta2-agonist(LABA) เช่น fluticasone และ salmeterol เป็นยาเดี่ยว เพิ่มความเสี่ยงของโรคหืดกำเริบรุนแรงและการเสียชีวิตการโรคหืด</p>
	3.4 <u>ANTI-HISTAMINES</u>				
71	CETIRIZINE 10 MG	TAB.	ก	B	
72	CHLORPHENIRAMINE 4 MG.	TAB.	ก	B	
73	CHLORPHENIRAMINE SYRUP 60 ML	SYR.	ก	B	
74	CHLORPHENIRAMINE INJ. 10 MG./ML.	INJ.	ก	B	
75	HYDROXYZINE 10 MG.	TAB.	ก	C	
	3.6 <u>COUGH PREPARATIONS</u>				
76	GLYCERYL GUACOLATE 100 MG	TAB.	ก	C	
77	GLYCERYL GUACOLATE 100 MG/5 ML	SYR.	ก	C	
78	DEXTROMETHOPHAN 15 MG.	TAB.	ก	C	
79	BROWN MIXTURE 60 ML.	MIXT.	ก		

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
	3.8 <u>OYHER RESPIRATORY PREPARATION</u>				
80	AROMATIC AMMONIA SPIRIT 450 ML.	SOL	ก		
กลุ่มยา 4 : CENTRAL NERVOUS SYSTEM					
	4.1 <u>HYPNOTICS AND ANXIOLYTICS</u>				
81	DIAZEPAM 2 MG.	TAB.	ก	D	
82	DIAZEPAM 5 MG.	TAB.	ก	D	
83	DIAZEPAM 10 MG./2 ML.	INJ.	ก	D	
84	DIPOTASSIUM CLORAZEPATE 5 MG	CAP.	ข	D	
85	LORAZEPAM 0.5 MG.	TAB.	ก	D	
	4.2 <u>PSYCHOSES AND RELATED DISORDERS</u>				
86	CHLORPROMAZINE 50 MG.	TAB.	ก	C	
87	CHLORPROMAZINE 100 MG.	TAB.	ก	C	
88	HALOPERIDOL 2 MG.	TAB.	ก	C	
89	HALOPERIDOL 5 MG.	TAB.	ก	C	
90	HALOPERIDOL 5 MG./ML.	INJ.	ก	C	
	4.3 <u>ANTIDEPRESSANTS</u>				
91	AMITRIPTYLINE 10 MG.	TAB.	ก	C	
92	AMITRIPTYLINE 25 MG.	TAB.	ก	C	
93	FLUOXETINE 20 MG	TAB.	ก	C	
	4.5 <u>NAUSEA AND VERTIGO</u>				
94	DIMENHYDRINATE 50 MG.	TAB.	ก	B	
95	DIMENHYDRINATE 50 MG./ML.	INJ.	ก	B	
96	FLUNARIZINE 5 MG	CAP.	NED		
	4.6 <u>ANALGESICS AND ANTIPYRETICS</u>				
97	PARACETAMOL 325 MG.	TAB.	ก	B	แนะนำให้ใช้เป็น first-line drug สำหรับ osteoarthritis
98	PARACETAMOL 500 MG.	TAB.	ก	B	แนะนำให้ใช้เป็น first-line drug สำหรับ osteoarthritis
99	PARACETAMOL 120 MG./5 ML.	SYR.	ก	B	แนะนำให้ใช้เป็น first-line drug สำหรับ osteoarthritis
	4.7 <u>ANALGESICS</u>				
100	ERGOT 1 MG. + CAFF 100 MG.	TAB.	ค	X	

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
101	TRAMADOL 50 MG	CAP.	ค	C	
102	MORPHINE SULFATE SR 10 MG	TAB	ค		
103	MORPHINE SULFATE IR 10 MG	TAB	ค		
104	MORPHINE 10 MG./ML.	INJ.	ค	C;D**	
105	MORPHINE SULFATE Oral solution 10 mg/5 ml	SOL	ค		
106	METHADONE HYDROCHLORIDE 10 mg/ml	SOL	ค	C	
107	PETHIDINE 50 MG./ML.	INJ.	ค	B;D**	
108	FENTANYL PATCH 4.2 MG.	PATCH	ค		
	4.8 <u>ANTIEPILEPTICS</u>				
109	PHENOBARBITONE 30 MG.	TAB.	ก	D	
110	PHENOBARBITONE 60 MG.	TAB.	ก	D	
111	PHENYTOIN 100 MG.	CAP.	ก	D	
112	PHENYTOIN	INJ.	ก		
113	MAGNESIUM SULFATE 10 % 10 ML.	INJ.	ก	B	
114	MAGNESIUM SULFATE 50 % 2 ML.	INJ.	ก	B	
	4.9 <u>PARKINSONISM AND RELATED DISORDERS</u>				
115	BENZHEXOL 2 MG.	TAB.	ก	C	
116	BENZHEXOL 5 MG.	TAB.	ก	C	
<b>กลุ่มยา 5 : INFECTIONS</b>					
	5.1 <u>ANTIBACTERIAL</u>				
	5.1.1 <u>PENICILLINS</u>				
117	AMOXYCILLIN 250 MG.	CAP.	ก	B	
118	AMOXYCILLIN 500 MG.	CAP.	ก	B	
119	AMOXYCILLIN DRY SYRUP 125 MG/5 ML	SYR.	ก	B	



	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
120	AMOXYCILLIN + CLAVULANIC	SYR.	ค	B	<p>1. ใช้สำหรับการติดเชื้อที่สงสัยว่าอาจเกิดจากเชื้อ <i>H. influenzae</i> และ/หรือ <i>M. Catarrhalis</i> ที่ติดต่อ ampicillin</p> <p>2. ใช้รักษาโรคติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียชนิด aerobes และ anaerobes</p> <p>3. ประเมิน DUE ก่อนสั่งใช้</p>
121	AMOXYCILLIN + CLAVULANIC 1 G	TAB.	ค	B	<p>1. ใช้สำหรับการติดเชื้อที่สงสัยว่าอาจเกิดจากเชื้อ <i>H. influenzae</i> และ/หรือ <i>M. Catarrhalis</i> ที่ติดต่อ ampicillin</p> <p>2. ใช้รักษาโรคติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียชนิด aerobes และ anaerobes</p> <p>3. ประเมิน DUE ก่อนสั่งใช้</p>
122	DICLOXACILLIN 250 MG.	CAP.	ก	B	
123	PENICILLIN V 125 MG.	TAB.	ก	B	
124	PENICILLIN V 250 MG.	TAB.	ก	B	
125	PENICILLIN V DRY SYRUP 125 MG./5 ML.	SYR.	ก	B	
126	AMPICILLIN 250 MG.	INJ.	ก	B	
127	AMPICILLIN 500 MG.	INJ.	ก	B	
128	AMPICILLIN 1 GM.	INJ.	ก	B	
129	CLOXACILLIN 500 MG	INJ.	ก	B	ใช้ cefazolin ทดแทนเนื่องจากขาดทั่วประเทศ
130	CLOXACILLIN 1 GM.	INJ.	ก	B	ใช้ cefazolin ทดแทนเนื่องจากขาดทั่วประเทศ
131	BENZATHINE PENICILLIN 1.2 MU	INJ.	ก	B	
132	PGS 1 MU	INJ.	ก	B	
133	PGS 5 MU	INJ.	ก	B	
	5.1.2 <u>CEPHALOSPORINS</u>				

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
134	CEFTRIAXONE 1 GM.	INJ.	ค	B	1. ใช้สำหรับ serious community acquired bacterial infection ยกเว้น การติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa 2. ใช้สำหรับ gram-negative meningitis ยกเว้นในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี 3. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Penicillin Resistant S. pneumoniae (PRSP) 4. ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบบางกรณี ในผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่อง ซึ่งไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม aminoglycosides ได้ 5. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Gonococcus
135	CEPHALEXIN 250 mg	CAP.	ก	B	ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียกรัมบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง S. aureus ในผู้ป่วยที่แพ้ penicillin แบบไม่รุนแรงและการติดเชื้อในชุมชนจากแบคทีเรียกรัมลบบางชนิด เช่น E. coli เป็นต้น
136	CEPHALEXIN 125 mg/ml	SYR	ก	B	ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียกรัมบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง S. aureus ในผู้ป่วยที่แพ้ penicillin แบบไม่รุนแรงและการติดเชื้อในชุมชนจากแบคทีเรียกรัมลบบางชนิด เช่น E. coli เป็นต้น
	5.1.3 <u>TETRACYCLINS</u>				
137	DOXYCYCLINE 100 MG	CAP.	ก	D	
	5.1.4 <u>AMINOGLYCOSIDES</u>				
138	GENTAMICIN 80 MG./2 ML.	INJ.	ก	C	
	5.1.5 <u>MACROLIDES</u>				
139	ROXITHROMYCIN 150 MG.	TAB.	ก		
140	ERYTHROMYCIN DRY SYRUP 125 MG/5 ML	SYR.	ก	B	ใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หมายเหตุ ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคตับ
141	ERYTHROMYCIN 250 mg	TAB.	ก	B	

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
142	CLARITHOMYCIN 500 MG (โครงการพิเศษ ARV) ***	TAB.	ง		1. ใช้สำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจ ในกรณีที่ใช้ยาอื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล 2. ใช้ในข้อบ่งชี้พิเศษสำหรับโรคติดเชื้อ non-tuberculous <i>Mycobacterium</i> sp. (atypical mycobacterium) 3. ใช้ใน triple therapy หรือ quadruple therapy สำหรับกำจัดเชื้อ <i>H. pylori</i> หลังจากได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อแล้ว หรือใช้สำหรับ complicated ulcer ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ยา NSAIDs 4. ใช้สำหรับผล. ARV
	5.1.6 <u>QUINOLONES</u>				
143	NORFLOXACIN 400 MG.	TAB.	ก	C	
144	OFLOXACIN 200 MG.	TAB.	ข	C	ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ
	5.1.7 <u>SULPHONAMIDES AND TRIMETHOPRIM</u>				
145	CO - TRIMOXAZOLE (400/80)	TAB.	ก	C/D*	
146	CO-TRIMOXAZOLE SUSPENSION 60 ML	SYR.	ก	C/D*	
	5.1.8 <u>OTHER ANTIBACTERIALS</u>				

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
147	CLINDAMYCIN 150 MG	CAP.	ข	B	<p>1. ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด anaerobes, แบคทีเรียกรัมบวกชนิดรุนแรงในผู้ป่วยที่แพ้ยากลุ่ม beta-lactam แบบ type I (anaphylaxis หรือ urticaria) หรือการติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรัมบวก และ anaerobes</p> <p>2. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการป้องกันหรือรักษา Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) ในผู้ป่วยเอดส์</p> <p>3. ไม่ควรใช้รักษาโรคติดเชื้อนอกเหนือไปจากข้อ 1 และข้อ 2 เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิด Antibiotics Associated Colitis (AAC) หมายถึง AAC เกิดขึ้นได้กับยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้างทุกชนิดแม้แต่ amoxicillin</p>
148	CLINDAMYCIN 600 mg/4 ml	INJ.	ข	B	เช่นเดียวกับ clindamycin 150 mg cap.
	5.1.9 <u>ANTITUBERCULOSIS</u>				
149	ETHAMBUTOL 400 MG	TAB.	ก	B	
150	ETHAMBUTOL 500 MG	TAB.	ก	B	
151	ISONIAZID 100 MG	TAB.	ก	C	
152	PYRAZINAMIDE 500 MG	TAB.	ก	C	
153	RIFAMPICIN 300 MG	CAP.	ก	C	
154	RIFAMPICIN 450 MG	CAP.	ก	C	
155	STREPTOMYCIN 1 gm	INJ.	ก	D	
	5.1.10 <u>ANTILEPROTIC</u>				
156	DAPSONE 100 MG	TAB.	ก	C	
	5.2 <u>ANTIFUNGAL</u>				

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
157	FLUCONAZOLE 200 MG.	CAP.	ก	C	ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ของ amphotericin B ในการรักษา cryptococcosis หรือ candidiasis เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถใช้ amphotericin B ได้
158	GRISEOFULVIN 500 MG.	TAB.	ก	C	
159	KETOCONAZOLE shampoo	SOL	NED	C	
	5.3 <u>ANTIVIRAL</u>				
160	ACYCLOVIR 400 MG.	TAB.	ก	B	1. ใช้สำหรับการติดเชื้อ varicella-zoster และ herpes simplex ในผู้ป่วยเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 2. ใช้สำหรับการติดเชื้อ herpes zoster ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติ ยกเว้น อีสุกอีใส (chicken pox) ในเด็ก 3. ใช้รักษาและควบคุม recurrent herpes simplex infection ที่รุนแรงในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติ
161	ATAZANAVIR 300 MG	CAP	จ		
162	3TC (LAMIVUDINE 150 MG)	TAB.	จ	C	
163	3TC (LAMIVUDINE 300 MG)	TAB.	จ	C	
164	AZT (ZIDOVUDINE 100 MG)	TAB.	จ	C	
165	AZT (ZIDOVUDINE 300 MG)	TAB.	จ	C	
166	Zilavir (AZT +3TC,300+150mg)	TAB.	จ		
167	EFAVIRENZ 600 MG	TAB.	จ	D	
168	GPO VIR Z 250 MG (NEVI200+LAMI150+AZT250)	TAB.	จ		
169	TEEVIR (TDF+Emtircitamine+EFV)	TAB.	จ		
170	TLD (tenofovir+lamivudine+dolutegravir)	TAB	จ		
171	KALETRA (lopinavir+ritonavir)	CAP.	จ		
172	NEVIRAPINE 200 MG	TAB.	จ	B	
173	DIDANOSINE 125 mg	TAB.	จ	B	
174	RITONAVIR 100 MG	CAP	จ		
175	TENOFOVIR 300 mg	TAB.	จ		

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
176	OSELTAMIVIR 75 mg	CAP.	จ	C	ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไข และเตรียมพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดนกของประเทศ
177	Favipiravir (200 mg) (เฉพาะโควิด19)	TAB	จ		
178	Remdesivir 100 mg/vial (เฉพาะโควิด19)	INJ.	NED		
	5.4 <u>ANTIPROTOZOAL</u>				
179	METRONIDAZOLE 200 MG.	TAB.	ก	B	ใช้สำหรับ amebiasis, giardiasis และ urogenital trichomoniasis
180	METRONIDAZOLE 500 MG./100 ML.	INJ.	ก	B	ใช้สำหรับ amebiasis, giardiasis และ urogenital trichomoniasis
181	CHLOROQUIN 250 mg	TAB.	ก	C	
182	PRIMAQUINE 15 mg	TAB.	ก	C	
183	PRIMAQUINE 5 mg	TAB.	ก	C	
184	QUININE	TAB.	ก	C	
185	ARTESUNATE	TAB.			
	5.5 <u>ANTHELMINTICS</u>				
186	ALBENDAZOLE 200 MG.	TAB.	ก	C	
187	DIETHYLCARBAMAZINE 300 MG	TAB.	ก		
188	ALBENDAZOLE SUSPENSION 30 ML	SYR	ก	C	
	5.6 <u>ANTISEPTICS</u>				
189	ALCOHOL 70% 450 ML.	SOL.	ก		
190	ALCOHOL 95% 450 ml	SOL.	ก		
191	CHLORHEXIDINE GLUCONATE 4% SCRUB	SOL.	ก		
192	ALCOHOL CLEAN CARE GEL	GEL	ก		
193	POVIDONE IODINE SOLUTION 450 ML.	SOL.	ก		
	5.7 <u>OTHER</u>				
194	CEFTAZIDIME (service plan)	INJ.			ใช้เป็น empiric/specific therapy สำหรับการติดเชื้อ <i>P. aeruginosa</i> และ melioidosis

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
กลุ่มยา 6 : ENDOCRINE SYSTEM					
	6.1 <u>DIABETICS</u>				
195	GLIPIZIDE 5 MG.	TAB.	ก	C	
196	METFORMIN 500 MG.	TAB.	ก	B	
197	NPH INSULIN 300 IU/3 ML.(PENFILL)	INJ.	ก	B	
198	REGULAR INSULIN 300 IU/3 ML.(PENFILL)	INJ.	ก	B	
199	MIXTARD INSULIN 300 IU/3 ML.(PENFILL)	INJ.	ก	B	1. ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เกิด hypoglycemia บ่อยเมื่อใช้ conventional insulin 2. ใช้สำหรับควบคุมภาวะ postprandial hyperglycemia
200	MIXTARD INSULIN 1,000 IU/10 ML.	INJ.	ก	B	1. ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เกิด hypoglycemia บ่อยเมื่อใช้ conventional insulin 2. ใช้สำหรับควบคุมภาวะ postprandial hyperglycemia
201	NPH INSULIN 100 IU/ ML (10 ml)	INJ.	ก	B	
202	PIOGLITAZOLE 30 MG	TAB	ง	C	ใช้ป็นยาชนิดที่สามเพิ่มเติม หลังจากใช้ยา sunfonylureas และ metformin แล้วเกิด secondary failure หรือใช้เมื่อแพ้ยา metformin หรือ sulfonylureas
	6.2 <u>THYROID AND ANTITHYROID</u>				
203	LEVO-THYROXIN SODIUM 100 MCG.	TAB.	ก	A	
204	PROPYLTHIOURACIL 50 MG.	TAB.	ก	D	
	6.3 <u>CORTICOSTEROIDS</u>				
205	PREDNISOLONE 5 MG.	TAB.	ก	C/D*	
206	DEXAMETHASONE 4 MG./ML.	INJ.	ก	C/D*	
207	Methylprednisolone 1 gm/vial	INJ.	ค		
	6.4 <u>SEX HORMONES</u>				
208	CONJUGATE ESTROGEN	TAB.	ข	X	
209	NORETHISTERONE 5 MG. (Primolute-N)	TAB.	ก	X	
กลุ่มยา 7 : OBSTETRICS , GYNAECOLOGY & URINARY TRACT DISORDER					
	7.1 <u>OBSTETRICS</u>				

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
210	METHYLERGOMETRINE INJ. 200 MCG./ML.	INJ.	ก		
211	OXYTOCIN 10 IU/ML.	INJ.	ก	X	
212	Transamic acid 250 mg/5 ml	INJ.	ก		
	7.2 <u>VAGINAL AND VULVAL CONDITION</u>				
213	CLOTRIMAZOLE VAGINAL TABLET	SUPP.	ก	B	
	7.3 <u>CONTRACEPTIVES</u>				
214	LYNESTRENOL 0.5 MG. 28'S (Exluton)	TAB.	ข	D	
215	ETONOGESTREL 68 MG. (IMPLANT 1 rod)	ROD	ก	X	
216	LEVONORGESTREL 0.15 MG+EE 0.03 MG	TAB.	ก	X	
217	MEDROXYPROGESTERONE 150 MG./3 ML.	INJ.	ก	X	
	7.4 <u>GENITO-URINARY DISORDER</u>				
<b>กลุ่มยา 9 : NUTRITION AND BLOOD</b>					
	9.2 <u>FLUIDS AND ELECTROLYTE</u>				
218	CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE	POW	ข		
219	GLUCOSE POWDER	POW			
220	D-5-1/2 S 500 ML.	SOL.	ก		
221	D-5-1/2 S 1,000 ML.	SOL.	ก		
222	D-5-1/3 S 500 ML.	SOL.	ก		
223	D-5-1/5 S 500 ML.	SOL.	ก		
224	D-5-S 500 ML.	SOL.	ก		
225	D-5-S 1,000 ML.	SOL.	ก		
226	D-5-W 100 ML.	SOL.	ก		
227	D-5-W 500 ML.	SOL.	ก		
228	D-5-W 1,000 ML.	SOL.	ก		
229	D-10-W 500 ML.	SOL.	ก		
230	D-10-1/2 S 1,000 ML.	SOL.	ก		
231	DEXTROSE 50 % 50 ML.	SOL.	ก		
232	POTASSIUM CHLORIDE elixir 20 mEq 15 ML.	SOL.	ก	C	
233	POTASSIUM CHLORIDE INJ. 20 mEq 10 ML.	SOL.	ก	C	



	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
234	RINGER LACTATE SOLUTION 1000 ML.	SOL.	ก		
235	SODIUM BICARBONATE 300 MG.	TAB.	ก	C	
236	SODIUM CHLORIDE 0.9% 100 ML.	SOL.	ก		
237	SODIUM CHLORIDE 0.9% 500 ML.	SOL.	ก		
238	SODIUM CHLORIDE 0.9% 1000 ML.	SOL.	ก		
239	SODIUM CHLORIDE 3% 500 ML.	SOL.	ก		
240	STERILE WATER 100 ML.	SOL.	ก		
241	STERILE WATER 1000 ML. IRRIGATE	SOL.	ก		
242	VITAMIN K 1 MG	INJ.	ก	C	
243	GELOFUSINE 500 ML	INJ.	ก		
244	MANITOL	INJ.	ก	C	
	9.3 <u>VITAMINS</u>				
245	FOLIC ACID 5 MG.	TAB.	ก	A;C	1. ใช้สำหรับเสริมโฟเลทตลอดการตั้งครรภ์ 2. ใช้สำหรับเสริมโฟเลทในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร 3. กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่เคยมีประวัติตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรที่มีภาวะ neural tube defect หรือปากแหว่งเพดานโหว่ ควรใช้ความแรง 5 mg
246	MULTIVITAMIN	TAB.	NED		
247	MULTIVITAMIN SYRUP	SYR.	ก		
248	POTASSIUM CHLORIDE 500 MG.	TAB.	ก	A	
249	VITAMIN B COMPLEX	TAB.	NED		
250	VITAMIN B6 50 MG	TAB.	ก	A	การรับประทานวิตามิน B6 ขนาดตั้งแต่ 200 มิลลิกรัมต่อวัน ขึ้นไปเป็นเวลานาน มีความสัมพันธ์กับการเกิด neuropathy ได้
251	VITAMIN C 100 MG.	TAB.	ก		ใช้ตามแนวทางห้องส่งเสริม
252	VITAMIN B COMPLEX 2 ML.	INJ.	ก		
253	TRIFERDINE- 150	TAB	ก		
	9.5 <u>MINERALS</u>				

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
254	CALCIUM CARBONATE 1250 MG.	CAP.	ก	C	
255	FERROUS FUMARATE 200 MG	TAB.	ก		
256	FERROUS FUMARATE SOL.	SOL.	ข		
กลุ่มยา 10 : MUSCULOSKELETAL AND JOINT DISEASE					
	10.1 <u>RHEUMATICS DISEASE AND GOUT</u>				
257	ALLOPURINOL 100 MG.	TAB.	ก	C	ห้ามใช้รักษา acute gout ค่าเดือนและข้อควรระวัง : ควรเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนังชนิดร้ายแรงจากยา เช่น SJS , TEN และDRESS เนื่องจากมีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปได้แก่ ผู้ที่เริ่มใช้ยา (ในช่วง 4 สัปดาห์แรก) ผู้ที่มีภาวะไตเสื่อม ผู้ที่ใช้ allopurinol ในขนาดสูง และผู้ที่ใช้ยาขับปัสสาวะในกลุ่ม thiazide ร่วมด้วย
258	COLCHICINE 0.6 MG.	TAB.	ก	D	
259	IBUPROFEN SYRUP 100 MG./5 ML. 60 ML.	SYR.	ก	B;D**	1. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น 2. ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกร็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก
260	NAPROXEN 250 MG	TAB.	ข	C;D**	
261	TOLPERISONE 50 MG.	TAB.	NED		
262	DICLOFENAC 25 mg	TAB.	ก		
263	DICLOFENAC INJ. 75 MG./3 ML.	INJ.	ก	B;D**	
	10.3 <u>RELIEF OF SOFT TISSUE INFLAMMATION</u>				
264	ANALGESIC BALM 15 GM.	OINT.	ก		
กลุ่มยา 11 : EYE					
	11.1 <u>ANTI-INFECTIVE EYE PREPARATION</u>				
265	POLY-OPH EYE DROP	SOL.	ข	C	ยาที่มีส่วนผสมของ polymycin B อาจส่งผลให้เกิดการต้อของเชื้อในทาง systemic จึงต้องใช้อย่างระมัดระวังเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
266	TERRAMYCIN OINTMENT (oxytetracycline)	OINT.	NED		
	11.2 <u>CORTICOSTEROID AND ANTI-INFLAMMATORY PREPARATION</u>				
267	HISTA OPH 5 ML.	SOL.	ก	C	
	11.3 <u>MYDRIATIC</u>				
	11.5 <u>LOCAL ANAESTHETIC</u>				
268	TETACAINE EYE DROP	SOL.	ก	C	
กลุ่มยา 12 : EAR , NOSE , OROPHARYNX AND ORAL CAVITY					
	12.1 <u>EAR</u>				
	12.3 <u>OROPHARYNX AND ORAL CAVITY</u>				
269	GLYCERIN BORAX 30 ML.	SOL.	ก		
270	TRIAMCINOLONE 0.1 % ORAL PASTE 1 G	GEL	NED		
271	NORMAL SALINE FOR IRRIGATE 1000 ML.	SOL.	ก		
กลุ่มยา 13 : SKIN					
	13.1 <u>ANTI-INFECTIVE SKIN PREPARATION</u>				
272	BENZYL BENZOATE EMULSION 450 ML.	LOT.	ก		
273	CLOTRIMAZOLE CREAM 5 GM.	CR.	ก		
274	SILVER NITRATE 50 % (รพ.สงขลานครินทร์)	SOL.	ก		
275	SULFADIAZINE SILVER 1 % CREAM 25 GM.	CR.	ก		
276	TRIPPLE (รพ.สงขลานครินทร์)	SOL.	NED		
	13.2 <u>EMOLLIENT AND BARRIER PREPARATION</u>				
277	OLIVE OIL 450 ML.	OIL	ก		
278	VASALINE 450 GM.	GEL	ก		
	13.3 <u>TOPICAL AND ANTIPRURITIC</u>				
279	CALAMINE LOTION 60 ML.	LOT.	ก		
	13.4 <u>TOPICAL CORTICOSTEROID</u>				
280	BETAMETHASONE 0.1% CREAM 5 GM.	CR.	ก		
281	TRIAMCINOLONE 0.02 % CREAM 5 GM.	CR.	ก		
282	TRIAMCINOLONE 0.1 % CREAM 5 GM.	CR.	ก		
	13.6 <u>PREPARTION FOR WART AND CALLUSE</u>				

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
<b>กลุ่มยา 14 : IMMUNOLOGICAL PRODUCT AND VACCINE</b>					
283	ERIG 1,000 IU/5 ML.	INJ.	ก		
284	RABIE VACCINE 0.5 ML.	INJ.	ก		1. ใช้สำหรับ post-exposure protection 2. ใช้สำหรับ pre-exposure protection ในประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
285	TETANUS ANTITOXIN 1,500 IU./ML.	INJ.	ก		
286	TETANUS TOXOID 5 ML.	INJ.	ก	C	
<b>กลุ่มยา 15 : ANAESTHESIA</b>					
	15.2 LOCAL ANAESTHESIA				
287	LIDOCAINE 1 % 20 ML.	INJ.	ก	B	
288	LIDOCAINE 2 % 20 ML.	INJ.	ก	B	
289	LIDOCAINE 1 % WITH ADRENALINE 20 ML.	INJ.	ก	B/C*	
290	LIDOCAINE 2 % JELLY	GEL	ก	B	
<b>กลุ่มยา 16 : ANTIDOTES</b>					
291	ACETYLCYSTEINE 200 MG.	PWDR.	NED	B	เพิ่มใช้แก้พิษที่เกิดจากการได้รับ paracetamol เกินขนาด
292	ACTIVATED CHARCOAL 50 G	PWDR.	ก		ใช้ดูดซับสารพิษทั่วไป
293	ATROPINE INJ. 0.6 MG./ML.	INJ.	ก	C	ใช้ต้านพิษ cholinesterase inhibitors (เช่น organophosphates , carbamates) และภาวะ chlinergic crisis
294	CALCIUM GLUCONATE 10 % INJ. 10 ML.	INJ.	ก	C	ใช้บำบัดพิษที่เกิดจาก hydrofluoric และ calcium channel clockers หมายเหตุ : ให้ฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้า ๆ การฉีดเร็วอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
295	COBRA SERUM 10 ML.	INJ.	ก		
296	MALAYAN PIT VIPER SERUM 10 ML.	INJ.	ก		
297	NALOXONE INJ. 0.4 MG./ML.	INJ.	ก	B	1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารกลุ่ม opioids และ clonidine 2. ใช้บำบัดภาวะกดการหายใจที่ไม่ทราบสาเหตุ

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
298	SODIUM BICARBONATE 7.5% 50 ML.	INJ.	ก	C	1. ใช้บำบัดภาวะ hyperkalemia และพิษที่เกิดจากสาร tricyclic antidepressants , antiarrhythmics type I 2. ใช้ปรับปัสสาวะให้เป็นต่าง เพื่อเร่งการกำจัดสารพิษ เช่น salicylates , metformin, phenformin เป็นต้น
กลุ่มยา 17 : OTHERS					
299	Lubricant gel	Gel			
กลุ่มยา 18 : สมุนไพร					
300	ขมิ้นชันแคปซูล	CAP	ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์		
301	ฟ้าทะลายโจร	CAP	x		
302	ยาอมมะแว้ง	LOZ			
303	ครีมไพล	CRE			
304	เพชรสังฆาต	CAP	ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์		
305	มะขามแขก	TAB	ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์		
306	สหัสตรา	CAP	x		
307	แก้ไอมะขามป้อม	SYP			
308	ลูกประคบ				
309	ครีมพญาหยอ	CRE			
310	เถาวัลย์เปรียง				
311	ยาหอมเทพจิตร	TAB			
312	ยาหอมนวโกฐ	CAP			
313	ยาประสะไพล	CAP			
314	ยาชิง	CAP			
315	ยาปราบชมพูทวีป	CAP			
316	ยาธรณีสังฆาต	CAP			
317	ยาธาตุดิบ	sol			
318	ยาตรีผลา	tab			
319	ยาหอมทิพโอสถ				

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
320	ยาธาตุนบรจบ	tab			
321	ยาเบญจกูด	tab			
322	ยาจันทีลลา	tab			
323	ยาประสะจันทน์แดง	tab			
324	ยาแก้ไข้ห่ารอก	tab			
325	ยารักษาโรคโลหิต	tab			
326	ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง				
327	ยากระเจี๊ยบแดง				
328	ยาหญ้าดอกขาว				
329	เจลวุ้นหางจระเข้	gel			
กลุ่มจิตเวช (service plan)					
330	CARBAMAZEPINE 200 MG	TAB	ก,ข		
331	CHLORPROMAZINE 25 MG	TAB	ก		
332	CLONAZEPAM 0.5 MG	TAB	ข		
333	CLONAZEPAM 2 MG	TAB	ข		
334	CLOZAPINE 25 MG	TAB	ค		1. ไม่ควรใช้เป็นยาตัวแรกในการรักษา 2. ควรได้รับการวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์
335	CLOZAPINE 100 MG	TAB	ค		เช่นเดียวกับ clozapin 25 mg
336	IMIPRAMINE HCL 25 MG	TAB	ก		
337	LITHIUM 300 MG	TAB	ก		
338	NORTRIPTYLINE 25 MG	TAB	ก		
339	PERPHENAZINE 2 MG	TAB	ก		
340	PERPHENAZINE 4 MG	TAB	ก		
341	PERPHENAZINE 8 MG	TAB	ก		
342	PERPHENAZINE 16 MG	TAB	ก		

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
343	RISPERIDONE 1 MG	TAB	ค		1. ไม่ควรใช้เป็นยาตัวแรกในการรักษา 2. ควรได้รับการวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ <b>คำเตือนและข้อควรระวัง</b> ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ
344	RISPERIDONE 2 MG	TAB	ค		เช่นเดียวกับ risperidone 1 mg
345	SODIUM VALPROATE 200 MG	TAB	ก		
346	SODIUM VALPROATE 500 MG	TAB	ก		
347	SERTRALINE 50 MG	TAB	ค		1. ไม่ควรใช้เป็นยาตัวแรกในการรักษา 2. ควรได้รับการวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์
348	THIORIDAZINE 25 MG	TAB	ค		
349	THIORIDAZINE 50 MG	TAB	ค		
350	TRAZODONE 50 MG	TAB	ค		
351	TRAZODONE 100 MG	TAB	ค		
352	TRIFLUOPERAZINE 5 MG	TAB	ก		
353	VITAMIN B.1	TAB	ก		
354	MIANSERIN HCL 10 MG	TAB	ข		
	ยาฉีด				
355	CLOPIXOL 100 MG INJ	INJ	NED		
356	FLUPHENTIXOL 40 MG/2 ML	INJ	ค		ใช้ในกรณีใช้ยาอื่นไม่ได้ผล
357	FLUPHENNAZINE 25 MG/ML	INJ	ก		
358	HALOPERIDOL 50 MG/ML	INJ	ก		
	รายการยาทั้งหมด 351 รายการและสารเคมี 7 รายการ (1.chlohexidine scrub4%,2.vaseline,3.glucose,4.olive oil,5.glycerine borax,6.ammonia,7.lubricant gel)				
	ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 341 รายการ				
	ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 10 รายการ				

	รายการ	รูปแบบ	บัญชี	Preg Cat	เงื่อนไข
	สัดส่วน ED : NED = 97.15 : 2.85				